

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Медиус F1

МИМУЛЮС ГИБРИДНЫЙ / *Mimulus hybrida*

Преимущества серии

- компактные, обильно ветвящиеся растения
- крупные цветки типа грандифлора
- короткий период от посева до продажи
- особенно пригодны для тенистых и влажных мест
- отлично подходят для горшков и подвесных корзин

Характеристики растений

Использование	крупные горшки, смешанные контейнерные композиции, подвесные корзины, цветники
Место выращивания	тень, полутень
Период выращивания	6–8 недель от посева
Форма семян	гранулы, натуральные семена
Посев	по 1 грануле или семени в ячейку кассеты
Высота растений	20–25 см
Период цветения	ранняя весна — весна; конец лета — осень

Petunia / Ваш помощник для успешного выращивания



Рекомендации по выращиванию

Проращивание — стадии 0–1

Посев: по 1 грануле или семени в ячейку кассеты

Заделка семян: не засыпать

Влажность воздуха: почти 100 %

Температура: 18–20 °C

Субстрат: pH 5,5–5,8, ЕС менее 0,75

Световые условия: 200–1 000 лк

Влажность субстрата: уровень 4–5

Химобработка: после посева рекомендуется полив препаратом Превикур Энерджи (пропамокарб + фосэтил алюминия)

Проращивание — стадии 2–4

Температура: вначале 16–18 °C

Субстрат: pH 5,5–5,8, ЕС 1,0–1,4

Световые условия: досветка 16 000–32 000 лк

Влажность субстрата: уровень 2–4

Подкормки: по мере необходимости, 100–150 ppm N (ЕС 0,75–1,2)

Регуляторы роста: не требуются

Выращивание до получения готового растения

Размер горшка: 10 см

Температура: 10–15 °C

Субстрат: pH 5,5–5,8, ЕС 1,0–1,4

Влажность субстрата: уровень 2–3

Подкормки: по мере необходимости, 100–150 ppm N (1,5–2,0)

Регуляторы роста: при низких температурах не требуются; при более высоких температурах можно использовать даминозид в концентрации 1 500–2 500 ppm

Уровни влажности субстрата

5 (насыщенный водой) — в субстрате отчетливо видна вода

4 (мокрый) — субстрат мокрый на ощупь, но не насыщен водой

3 (влажный) — субстрат темный, но без блеска

2 (слегка влажный) — цвет субстрата меняется с черного на коричневатый

Данные рекомендации по выращиванию считаются лишь ориентировочными, на практике они должны быть каждым цветоводом индивидуально приспособлены в зависимости от его конкретных условий и технических возможностей.