

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Найт F1

ПЕЛАРГОНΙΑ ЗОНАЛЬНАЯ / Pelargonium × hortorum

Преимущества серии

- высокая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям
- серия с наиболее темной окраской листьев на рынке
- прекрасно сочетается с гибридами нашей зеленолистной серии
- превосходная выравненность растений в серии

Характеристики растений

Использование	цветники, большие и маленькие горшки, цветочные корзины и другое
Место выращивания	солнце, полутень
Период выращивания	14–16 недель от посева, в зависимости от условий выращивания
Форма семян	скарифицированные семена
Посев	по 1 семени в ячейку кассеты
Высота растений	25 см без соцветий, 35 см вместе с ними
Цветение	соцветия диаметром 10–12 см, очень обильное цветение
Период цветения	с ранней весны до конца лета

Petunia / Ваш помощник для успешного выращивания



Рекомендации по выращиванию

Проращивание — стадии 0–1

Посев: по 1 семени в ячейку кассеты

Заделка семян: засыпать тонким слоем вермикулита

Влажность воздуха: почти 100 %

Температура: 22–24 °C

Субстрат: pH 5,8–6,5, EC 0,75–1,0

Световые условия: 200–1 000 лк

Влажность субстрата: уровень 4–5

Химобработка: после посева рекомендуется полив препаратом Превикур Энерджи (пропамокарб + фосэтил алюминия)

Проращивание — стадии 2–4

Температура: вначале 18–21 °C, затем снизить до 16–18 °C

Субстрат: pH 5,8–6,5, EC 0,75–1,2

Световые условия: 4 500–7 000 лк

Влажность субстрата: уровень 2–4

Подкормки: по мере необходимости, 100–150 ppm N (EC 0,75–1,2)

Регуляторы роста: Сусосел, 200–250 ppm; первое опрыскивание после появления 3–5 настоящих листьев (примерно через 55 дней после посева)

Выращивание до получения готового растения

Размер горшка: 10–11 см

Температура: днем 21–24 °C, ночью 16–18 °C

После появления бутонов температура не должна опускаться ниже 13 °C.

Субстрат: pH 6,0–6,5, EC 1,5–2,0

Влажность субстрата: уровень 2–4

Подкормки: по мере необходимости, 100–175 ppm N (0,75–1,2)

Регуляторы роста

Провести всего 3–4 опрыскивания препаратом Сусосел. После первого опрыскивания последующие обработки проводить каждые 7 дней раствором с концентрацией не выше 150–200 ppm. С появлением первых бутонов обработки прекратить, так как дальнейшее применение препарата может привести к уменьшению размера цветков.

Уровни влажности субстрата

5 (насыщенный водой) — в субстрате отчетливо видна вода

4 (мокрый) — субстрат мокрый на ощупь, но не насыщен водой

3 (влажный) — субстрат темный, но без блеска

2 (слегка влажный) — цвет субстрата меняется с черного на коричневатый

Данные рекомендации по выращиванию считаются лишь ориентировочными, на практике они должны быть каждым цветоводом индивидуально приспособлены в зависимости от его конкретных условий и технических возможностей.